从马尾藻中提取高粘度海藻酸钠*

ALGINATE WITH HIGH VISCOSITY FROM *Sargassum*

侯振建¹ 刘婉乔²

(¹ 河南南阳理工学院生化工程系 473066)

(² 华南理工大学轻工食品学院 广州 510641)

* 马尾藻(*Sargassum*)是热带及温带多年生藻类,资源丰富,目前大多处于自生自灭状态。作者以马尾藻为原料,采用离子交换法生产海藻酸钠,得胶率达 23.7%,粘度达 1 300 m Pa·s,远高于 GB1976-80 规定的粘度(150 m Pa·s),也远高于目前的工业品的粘度,同时生产成本大幅度降低。

1 材料与方法

1.1 原料及试剂

* 国家教委博士点基金资助项目 9456113 号。
收稿日期:1996 年 11 月 14 日

马尾藻采自广东汕尾海面,洗净晾干备用。

Na_2CO_3 , CaCl_2 等均为分析纯试剂。

1.2 工艺流程

原料清洗→粉碎→浸泡→消化→预中和、冲稀→过滤→钙析→离子交换脱钙→漂白→干燥→成品。

2 结果及讨论

2.1 浸泡

该步骤可以除去杂质,并使藻体软化,有利于下一步提取。过去的工艺采用中性水浸泡,需时较长,并会引起酶促水解,作者采用加酸短时浸泡,实验结果见表 1。

表 1 不同浓度 HCl 浸泡对提取效果的影响

HCl(mol/L)	产率(%)	1% 胶液粘度(mPa·s)
0	17.7	470
0.01	18.1	455
0.05	20.2	450
0.10	21.8	423
0.20	18.4	415

注:浸泡时间为 2 h。

稀酸处理,可使水溶性成分如海藻糖胶、海藻淀粉、无机盐等溶出,还可使藻体内海藻酸盐转变为游离的海藻酸,同时使海藻酸部分降解,便于过滤提取。生产中选择 0.1 mol/L HCl。

2.2 消化

此过程完成以下转换:

(M 代表 Ca, Fe, Al 等金属离子, Alg 代表海藻胶)。

影响消化效果的主要因素有:碱液浓度、温度和时间(表 2、表 3)。

表 2 Na_2CO_3 浓度对海藻胶粘度和产率的影响

Na_2CO_3 (%)	粘度 (mPa·s)	产率 (%)
0.5	490	18.1
1.0	515	20.9
1.5	560	22.0
2.0	545	22.3
3.0	456	21.5
4.0	400	20.4

Na_2CO_3 浓度较低时藻体不能被完全破坏,复分解反应生成海藻酸钠的反应难以进行到底,使产量降低。相反 Na_2CO_3 浓度较高,则不但粘度大为下降,且由于

水解作用使海藻胶变为小分子物质而流失,产量也有所减少。综合考虑各种因素,以 1.5% 的 Na_2CO_3 为好。

表 3 消化温度和时间对海藻胶的影响

消化时间(h)	消化温度(°C)	粘度(mPa·s)	产率(%)
2	70	495	16.3
	75	510	16.8
	80	532	17.2
3	70	505	17.0
	75	520	17.8
	80	538	18.4
4	70	510	19.3
	75	525	20.5
	80	520	20.1

从表 3 可以看出,选择 75 °C, 4 h, 可获得较好提取效果。

2.3 钙析

经过滤后的胶液含大量水、水溶性无机盐和色素,加入 CaCl_2 可使水溶性海藻酸钠转变为水不溶性的海藻酸钙而析出,与水及其他杂质分离,反应式如下:

表 4 pH 值对钙析的影响

pH 值	凝析情况
1.0~2.0	属酸析
3.0~5.0	凝析不完全,母液中带有胶
6.0~7.0	母液清晰
7.5~8.0	母液清晰,凝集物加 HCl 有少量 CO_2

由表 4 看出,钙析时,受 pH 值影响颇大。即当胶液的 pH 值低于 6 时,凝析不完全, pH 为 6~7.0 时,凝析近乎完全,此时溶液清澈见底,当胶液 pH 高于 7.5 时,凝析完全,但产生较多的 CaCO_3 沉淀,对下道脱钙工序增加了困难。将 HCl 加进 CaCl_2 溶液中, HCl 加入总量(含预中和时加入量)占原料的 11%,以保证钙析时胶液 pH 值为 6.0~7.0。

当每升胶液加入 25 ml 10% CaCl_2 溶液,即加入量为 0.25% 时,凝析完全,母液清晰。当 CaCl_2 用量过大时,会给下步脱钙造成困难(见表 5)。

表 5 CaCl_2 用量对钙析的影响

10% CaCl_2 用量 ($\times 10^{-3}$)	凝析情况
15	极不完全
20	不完全
25	完全,母液清晰
30	完全,母液清晰

2.4 离子交换

海藻酸钙凝胶中的 Ca^{2+} 可被 Na^+ 交换下来, 获得最终产品海藻酸钠, 反应如下: $\text{Ca}(\text{Alg})_2 + 2\text{NaCl} = 2\text{NaAlg} + \text{CaCl}_2$

洗脱液为 10% 的 NaCl 溶液。这一过程可采用柱层析交换, 也可用容器进行间歇式交换。间歇式交换的过程为: 将海藻酸钙凝胶投入 6 倍体积的 NaCl 溶液中, 常温搅拌 60 min, 滤出 NaCl 溶液, 即完成第一次交换。重复上述过程 5~6 次即可。废 NaCl 溶液可再生重复使用。所得海藻酸钠经 H_2O_2 漂白、干燥后即成品。

3 结语

3.1 本研究在国内外首次使用离子交换法, 以马尾藻作原料生产高粘度的海藻酸钠, 产率为 23.7%, 产品粘度大于 $1300 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 。应用于工业生产, 预计可产生很大的经济效益和社会效益。

3.2 目前在海藻酸钠工业生产中, 用酸凝法或钙凝法从海带中提取海藻酸钠, 其产率和质量都不理想。

本研究为改造海带提胶工艺提供了可能性。

3.3 从马尾藻提取的海藻酸钠, 其 L-古罗糖醛酸的含量较高, 具有特殊的空间结构。对重金属和放射性元素结合力较强, 具有更好的保健功能。经第一军医大学动物实验表明, 对恶性肿瘤抑瘤率大于 30%。

3.4 高粘度的海藻酸钠除增稠性好以外, 还有凝胶强度高、成膜性、成丝性好等特点, 可望开发出新用途的产品, 如止血纱布、食用薄膜等。

参考文献

- [1] 金 骏等, 1993。海藻利用与加工。科学出版社, 80~107。
- [2] 曾呈奎、纪明侯, 1962。海洋科学集刊 1: 140~157。
- [3] 外相键山, 1980。粗海藻酸钠制造法, 公开特许公报, 昭 55-147 752。
- [4] 田中茂穗, 1981。水溶性高分子化合物制造法, 公开特许公报, 昭 56-104 902。